(H) 武汉大学中南医院

武汉大学中南医院学科与平台建设办公室

电话：027-67811479（综合服务热线）
027-67812912（学科服务热线）
027-67812923（专利服务热线）
027-67812976（平台服务热线）
027-67811702（主任办热线）

网址：<http://xkjspt.znhospital.cn>
邮箱：znyyxkpt@126.com

学科建设月报

- ◆ 总策划：侯祚勇
- ◆ 总编辑：黄建英

武汉大学中南医院学科与平台建设办公室制
2022年11月

院 训： 大医精诚 敬畏生命

愿景、宗旨： 您的健康是我们的追求

目 标： 国际一流综合性研究型教学医院

目 录

政策快讯.....	01
<国家政策>.....	01
<省市政策>.....	03
科技前沿.....	04
学科发展论坛： 神经外科.....	17
学科巡礼.....	30
专利信息.....	34
<专利动态>.....	34
<专利大讲堂-临床医生应当知道的专利常识>.....	34
学风建设.....	36
他山之石.....	38

<省市政策>

政策1: 湖北省科学技术厅 湖北省卫生健康委员会关于印发《湖北省临床医学研究中心管理办法》的通知

概述: 湖北省临床医学研究中心是提高我省临床医学研究和诊疗水平为宗旨, 以医疗机构为依托, 以协同创新网络为支撑, 开展临床研究、协同创新、学术交流、人才培养、成果转化、推广应用, 省级科技创新平台, 是湖北省临床的医学科技术创新体系的核心组成部分。为进一步加强医学科技创新体系建设, 规范湖北省临床医学研究中心建设, 和运行管理, 新修订的《管理办法》从总则、管理机构及其职责、申报与评审、运行管理、考核评估、附则等方面, 展开, 附件还包含《湖北省临床医学研究中心年度考核实施办法》。

MEDICAL CARE

1、L-半胱氨酸高通量筛选平台开发取得进展

中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队利用响应L-半胱氨酸的转录调控因子, 开发了L-半胱氨酸生物传感器, 建立了L-半胱氨酸生产菌种高通量筛选平台。研究人员首先通过体内L-半胱氨酸响应实验、体外凝胶阻滞迁移 (EMSA) 实验和DNA足迹实验, 初步解析了转录调控因子CcdR的调控机理, 建立了CcdR转录调控模型, 发现CcdR能够特异性结合L-半胱氨酸, 结合到特定启动子PccdA上游DNA序列上, 招募RNA聚合酶激活下游PccdA启动子的表达。基于上述原理, 研究团队将胞内L-半胱氨酸浓度输入信号与荧光强度的输出信号相偶联, 开发设计了一个L-半胱氨酸生物传感器, 实现了对胞内L-半胱氨酸浓度的实时监测。为了进一步提升L-半胱氨酸生物传感器的响应灵敏性和响应强度, 研究团队通过转录调控因子半理性设计改造、转录调控因子表达优化以及响应启动子的截短测试等策略, 对L-半胱氨酸生物传感器进行了优化。随后将构建的L-半胱氨酸生物传感器与流式细胞分选技术 (FACS) 偶联, 构建了L-半胱氨酸高通量筛选平台, 并分别应用于L-半胱氨酸合成途径关键酶的定向进化和L-半胱氨酸高产菌株的筛选, 实现关键酶丝氨酸乙酰转移酶活性提升了7倍, 并获得了10株L-半胱氨酸产量显著提升的突变菌株。

来源: Design of a genetically encoded biosensor to establish a high-throughput screening platform for L-cysteine overproduction (*Metabolic Engineering*)

2、人工构建完整的合成肠道微生物组

来自美国斯坦福大学的研究人员构建了一种由119种细菌组成的复杂肠道微生物组, 并成功移植到小鼠体内, 研究了微生物组与生命健康间的关联。研究人员通过分析人类微生物组计划 (Human Microbiome Project, HMP) 产生的宏基因组数据, 选出超过100种普遍存在于HMP受试者肠道内的微生物菌种, 在体外构建了一个由104种细菌组成的hCom1 (human community one) 微生物菌群。hCom1具有良好的稳定性, 其中98%的物种能够在无菌小鼠肠道内长期定植。为了更好地模拟天然肠道菌群, 研究人员进一步将人类粪便中的微生物引入到定植hCom1小鼠的肠道内, 发现多种新的细菌物种成功定植并填补了空缺的生生态位, 成功构建了包含119种细菌物种的hCom2合成微生物组。hCom2与小鼠天然微生物组一样, 能够抵御大肠杆菌引发的感染, 是一种理想的肠道微生物组研究模型。从头构建合成微生物组将进一步推动微生物工程疗法的发展, 未来有望移植到人体内用于治疗癌症、代谢疾病、抑郁症等多种疾病。

来源: Design, construction, and in vivo augmentation of a complex gut microbiome (*Cell*)

3、科学家揭示一项由人工智能增强的心房颤动筛查非随机干预试验

美国梅奥诊所研究团队评估了人工智能算法增强的靶向筛查心房颤动方法在识别房颤中的有效性。这项非随机干预试验对美国40个州的1003名患者（平均年龄为74岁）进行研究。这些患者为先前招募，有中风危险因素但先前无房颤，并在常规检测中做了心电图。参与者佩戴长达30天的连续动态心律监测仪，通过手机连接实时传输数据。人工智能算法应用于心电图，将患者分为高风险组和低风险组。在平均22.3天的连续监测中，370名低风险患者中有6人检测到心房颤动，633名高风险患者中有48人检测到心房颤动。与常规组相比，人工智能增强的筛查方式与心房颤动的检测率增加有关。研究结果表明，利用现有临床数据的人工智能增强的靶向筛查方法提高了房颤的检测率，并可提高房颤筛查的有效性。

来源: Artificial intelligence-guided screening for atrial fibrillation using electrocardiogram during sinus rhythm: a prospective non-randomised interventional trial(*LANCET*)

4、科学家揭示人类大脑皮层类器官发育图谱

美国哈佛大学研究团队揭示了人类大脑皮层类器官发育图谱，验证了类器官发育的细胞谱系。研究人员揭示了一个包含全面信息的细胞转录组、表观遗传学和空间信息的人类大脑皮层类器官发育图谱，包括超过61万个细胞，从神经祖细胞的产生到神经元和神经胶质亚型的分化。结果表明，细胞多样化与内源性的过程密切相关，与代谢状态无关。这说明可以使用该图谱来研究细胞命运特化。他们提出类器官发育的谱系中皮层细胞类型的纵向分子轨迹，类器官发育的谱系发育中具有预测人体神经元的早期转录多样性。研究结果验证了全面的类器官发育图谱，是研究人类大脑皮层类器官发育的宝贵资源。

来源: Proper acquisition of cell class identity in organoids allows definition of fate specification programs of the human cerebral cortex(*Cell*)

5、我国科学家发现磷脂过氧化增加缺血性心肌损伤中铁死亡的易感性

北京中医药大学、广州中医药大学、暨南大学研究团队利用动物和体外模型及多组学方法，明确心肌缺血/再灌注损伤中的关键脂质为富含磷脂酰乙醇胺的氧化多不饱和脂肪酸，花生四烯酸15-脂氧合酶-1(ALOX15)被确定为缺血诱发的磷脂过氧化的主要介质，并为化学遗传学方法进一步证实。ALOX15在缺血阶段诱导磷脂氧化为铁死亡信号。这一发现表征了心肌缺血损伤的一种新的分子机制，为早期干预心肌缺血损伤提供了一个潜在的治疗目标。

来源: ALOX15-launched PUFA-phospholipids peroxidation increases the susceptibility of ferroptosis in ischemia-induced myocardial damage(*Signal Transduction and Targeted Therapy*)

6、科学家首次以近乎原子的细节揭示听觉机制

俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的研究团队首次以近乎原子的细节揭示出负责听觉的内耳关键部分的结晶体，该研究为开发新型听力损伤治疗方法指明了方向。研究团队通过梳理方法分离出内耳将振动转化为声音的结晶体，并发现了被称为机械感觉转导复合物(机械感觉转导受体)的结晶体。研究人员通过冷冻电子显微镜揭示了内耳机械感觉转导复合物的结晶体，该复合物将振动转化为电脉冲，然后大脑将电脉冲转化为声音，这个过程被称为机械感觉转导，负责平衡和声音。由于秀丽隐杆线虫具有与人类非常相似的机械感觉转导复合物，因此该团队对其进行了深入研究。他们在将近五年的时间里，通过精心培育和分离技术对6000万只秀丽隐杆线虫进行了实验，并最终揭示了从秀丽隐杆线虫中分离的天然跨膜通道蛋白1(TMC-1)机械感觉转导复合物的单粒子低温电子显微镜结构。研究人员发现，听力损失可以通过改变机械感觉转导复合物蛋白的基因突变来遗传，也可以由损伤引起，包括持续暴露在巨大的噪音中，这让科学家们第一次看到了这个复杂的结构。

来源: <https://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-05314-8>(*Nature*)

7、科学家利用RNA的相分离对大肠杆菌进行空间工程化设计

法国巴黎大学研究团队利用RNA的相分离对大肠杆菌进行空间工程化设计。研究人员在大肠杆菌中人工合成了基于RNA分子架构的无膜细胞器。该细胞器包含RNA结合蛋白招募结构域，能够自发地通过液相分离，将细胞质分隔。荧光蛋白跟踪结果显示，细胞器具有多层结构，其组成和反应的稳定性受非平衡动力学的影响。研究表明，合成的细胞器具有类似于真核生物细胞器的生物过程隔离作用，可用于分隔生化途径，控制代谢途径分支点，调控mRNA翻译速率，以及构建蛋白质-蛋白质的相互作用。研究人员表示该细胞器将成为一个简单而通用的工具，用于在空间上控制大肠杆菌的生物化学反应，模块化设计简化了生物工程的“设计-建造-测试”周期。

来源: Spatial engineering of E. coli with addressable phase-separated RNAs(*Cell*)

8、我国科学家发现CAFs自噬促进胰腺导管腺癌进展新机制

复旦大学附属华山医院、清华大学及北京大学研究团队就CAFs通过自噬促进PDAC发生发展的机制开展研究。研究团队证实CAFs对谷氨酰胺缺乏的PDAC患者的生存至关重要。在谷氨酰胺缺乏的条件下，细胞核脆性X智力低下互作蛋白1(NUFIP1)与核糖体上的rRNA结合，并通过降解rRNA介导核糖体自噬。CAFs通过NUFIP1依赖性自噬分泌的核苷上调糖代谢相关转录因子MYC，激活PDAC肿瘤细胞对葡萄糖摄取和利用，最终促进肿瘤进展。此外，研究团队通过建立PDAC原位小鼠模型，发现通过靶向间质中的NUFIP1可抑制核苷分泌，从而实现减少肿瘤重量的目的。该研究揭示了一个全新的PDAC代谢网络，有望为PDAC治疗提供新的干预靶点。

来源: Cancer-associated fibroblasts employ NUFIP1-dependent autophagy to secrete nucleosides and support pancreatic tumor growth(*Nature Cancer*)

9、我国科学家在大肠杆菌中生物合成植物源三七素

已有研究表明三七素是由L-2,3-二氨基丙酸(L-DAP)和草酰辅酶A经酰基转移酶(BAHD3)缩合而成，但两种直接前体的合成途径尚不清晰，通过微生物异源生产三七素具有一定难度。近日，北京化工大学的科学家在《》发表了题为“”的研究论文。该研究通过筛选有效的异源酶，实现了两种直接前体L-2,3-二氨基丙酸和草酰辅酶A的生物合成，通过耦连乙醛酸氧化途径和草酰乙酸裂解途径，并对代谢网络进行了系统设计，最终三七素滴度达到1.29 g/L。该研究通过逆向生物合成方法设计人工途径，首次实现了三七素的从头生物合成。

来源: Biosynthesis of plant hemostatic dencichine in Escherichia coli(*Nature Communications*)

10、我国科学家揭示肺癌致病变异的遗传新机制

南京医科大学的科研团队揭示了肺癌致病变异的遗传新机制。该研究首次将大规模全基因组测序技术应用于非小细胞肺癌的全基因组关联研究，构建了高质量的中国人单倍型参考库，新发现多个非小细胞肺癌相关的常见和低频易感变异，系统解析了非小细胞肺癌编码区和调控区罕见致病变异，首次发现乳腺癌易感基因2(BRCA2)启动子区变异可增加8.84倍的肺癌发病风险，该效应在男性和女性间没有差异，并在前瞻性队列评价了BRCA2启动子区变异对肺癌发病风险的预测效能。在此基础上，研究团队搭建了“奥秘可思”(OMICS)平台，该平台可查询本研究中健康个体的基因组变异。该研究为揭示肺癌的遗传模式提供了新思路，为肺癌的遗传检测提供了大量候选变异，有助于完善肺癌高危人群的识别策略，也为肺癌的精准预防提供新的理论依据。构建的查询平台也为中国乃至东亚地区的医学和遗传学研究提供了基础数据。

来源: Analyses of rare predisposing variants of lung cancer in 6004 whole genomes in Chinese(*Cancer Cell*)

11、我国科学家破解首个苦味受体结构

上海科技大学的科研团队在马钱子碱激活人源苦味受体TAS2R46的结构基础研究中取得突破，破解了首个苦味受体结构。马钱子碱是一种有毒的苦味生物碱，从马钱子的种子中提取，具有抗炎镇痛等药用效果。科研团队使用单颗粒冷冻电镜技术成功解析了马钱子碱激活及无配体两种状态下TAS2R46受体与下游信号蛋白复合物的结构，揭示了苦味受体独特的三维结构及调控机制。通过与其它激活G蛋白偶联受体结构的比较分析，研究发现TAS2R46中存在一种新型激活开关，同时，TAS2R46构象动态的胞外域表明该受体可能存在多种配体结合模

式来实现其广谱的配体识别能力。此外，研究发现TAS2R46与下游特有的G蛋白转导素嵌合体存在预结合的相互作用模式。该研究为探索苦味受体的结构和作用机制开创了新途径，对不同家族G蛋白偶联受体的信号转导机制提出了深入的见解，填补了T类G蛋白偶联受体结构的空白，为化学感知类受体的药物发现提供了理论依据。

来源: Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46(*Science*)

12、我国科学家开发用于检测汗液代谢物的可穿戴金属有机框架传感器

中国科学院福建物质结构研究所联合南洋理工大学的科研团队实现了将MOFs直接集成到柔性电子装置中用于可穿戴汗液传感的研究。该研究通过将cMOF Ni₃HHTP₂-层状薄膜电极集成到柔韧透气的纳米纤维素基底上，提出一种湿粘式表皮汗液传感器。该传感器可以自适应地粘附在人体皮肤上，利用固有的导电性、高度多孔的结构和活跃的催化特性，选择性地准确检测汗液中的维生素C和尿酸等代谢物。该研究证明，Ni₃HHTP₂传感器的检测结果与高效液相色谱法(HPLC)的检测结果相同，在实际应用中具有可靠性。同时，该研究提出了一种无线表皮营养跟踪系统，用于监测日常活动过程中汗液中维生素C的动态变化，对于常规监测人体营养状况，避免营养不良的不良反应具有重要意义。这项研究为将多功能MOFs集成到柔性电子器件中，实现高性能生物传感应用提供了新思路，有助于基于多功能MOFs的柔性电子装置在个性化医疗监测方面的发展。

来源: Wet-adhesive On-skin Sensors Based on Metal-Organic Frameworks for Wireless Monitoring Metabolite in Sweat(*Advanced Materials*)

13、科学家利用机器学习方法解开临床癌症样本中的基因组密码

赫尔辛基大学的研究团队提出了一种准确分析癌症活检中基因组学数据的方法。该工具使用机器学习方法纠正了受损DNA，从而揭示了肿瘤中的真实突变过程。该研究在数百万个癌症样本中挖掘了巨大的价值。癌症是渐进式发展的，在纵向样本中的突变过程有助于识别临床信息进行预测因子，并对每个肿瘤进行诊断。在这项新研究中，该团队开发了名为FFPEsig的机器学习方法。FFPEsig可以准确揭示福尔马林如何使DNA突变。实验显示，正常情况下，如果不进行噪声消除，几乎一半的癌症过程将被忽略。然而，使用FFPEsig，90%以上的癌症过程能够被准确预测。FFPEsig使研究人员可以在室温下保存了几十年的肿瘤活体样本中鉴定临床相关特征。随着对本马林如何影响癌症基因组深入的解，该研究为利用成本效益高的大型存档样本转化已确认的特征检测提供了巨大的机会。研究人员指出，FFPEsig目前还不能完全消除批次效应的FFPE样本中出现的人为影响，并且其性能因癌症类型而异，因此必须对任何发现进行谨慎解读。不过该团队表示，这种新方法显著加快了临床应用的发展，或将直接影响癌症患者的治疗结果。他们还将进一步优化该方法，并将其应用于更广泛

来源: <https://www.nature.com/articles/s41467-022-32041-5>(*Nature Communications*)

14、科学家将血浆核小体表观遗传标记用于结直肠癌诊断

以色列魏兹曼科学研究所和希伯来大学研究团队开发了一种基于核小体表观遗传标记的血液检测方法，对于结直肠癌诊断可达到92%的精确度。核小体是染色体的基本组成单元，由DNA链缠绕组蛋白而成，当细胞破裂后，核小体脱落到血液中。血液游离核小体保留了丰富的表观遗传信息，为无创液体活检提供了新思路。该研究运用单分子成像方法，可灵敏地在荧光显微镜下捕获核小体表观遗传图谱，通过固相polyT链与核小体polyA链

征不同表观遗传学修饰的荧光抗体与之结合成像。研究人员应用该技术得到33个健康个体和63个结直肠癌患者血液样本中组蛋白表观遗传修饰和DNA甲基化信息，并检测了来自死亡肿瘤细胞的蛋白质生物标志物，由此得到了多维数据，使用机器学习模型，整合了上述三类标志物的分类信息，提高了诊断结直肠癌的本研究开发的高效率。本研究从小于1mL的血液标本中获取临床相关的多维度信息，有望实现结直肠癌精准诊断，并可能拓展应用于多种癌症、自身免疫病和心脏病的诊断中，成为传统检测方法的补充或替代工具。

来源: Multiplexed, single-molecule, epigenetic analysis of plasma-isolated nucleosomes for cancer diagnostics(*Nature Biotechnology*)

15、科学家开发出合理化深度学习超分辨率显微成像方法

中国科学院生物物理研究所与清华大学联合美国霍华德休斯医学研究所等研究团队提出了一套合理化深度学习显微成像技术框架，将光学成像模型及物理先验与神经网络结构设计相融合，合理化网络训练、预测过程，从而实现了高性能、高保真的显微图像去噪与超分辨率重建，并结合实验室自主研发、搭建的多模态结构光照明显微镜与高速晶格光片显微镜，将传统成像速度/时程提升30倍以上，实现了当前国际最快、成像时程最长的活体细胞成像性能，并首次对高摆动纤毛中转运蛋白的多种运输以及完整细胞分裂过程中核仁液-液分离过程进行了快速、多色、长时程、超分辨观测。综上，本研究提出了一种合理化深度学习超分辨率显微成像框架，解决了现有深度学习成像分辨率损失、预测不确定性、训练集不易采集等难题。同时，人工智能算法与光学显微成像技术的交叉创新，也为现代光学显微成像的发展开辟了新的技术路径。

来源: Rationalized deep learning super-resolution microscopy for sustained live imaging of rapid subcellular processes(*Nature Biotechnology*)

30、科学家利用多能干细胞模拟人类心脏多谱系发育图谱

加拿大多伦多大学的研究团队利用多能干细胞模拟了人类心脏多谱系发育图谱。研究人员利用人类多能干细胞建立了心脏发育模型，通过单细胞RNA测序来描述谱系特异表达和发育过程。通过对小鼠中胚层转录组的分析，研究人员发现信号通路的特异表达。利用这些信号通路从人类多能干细胞衍生出人类FHF、aSHF和pSHF中胚层亚群。通过分阶段控制这些信号通路，他们获得了表达关键的分子特征的心肌细胞。人类心脏谱系的发育与小鼠的发育轨迹一致，体现了心血管发育过程的保守性。这些结果建立了人类胚胎心脏发育的综合图谱，为模拟先天性心脏病、心室特异性心肌病以及开发治疗这些疾病的新疗法提供了研究基础。

来源: Modeling human multi-lineage heart field development with pluripotent stem cells(*Cell Stem Cell*)

31、我国科学家揭示细胞外囊泡在2型糖尿病中的作用

南京大学医学院附属鼓楼医院研究团队揭示出细胞外囊泡(EVs)介导了脂肪组织与大脑的联系，促进了与胰岛素抵抗有关的认知障碍。研究人员发现，脂肪组织衍生的细胞外囊泡及其包裹的微小核糖核酸(miRNAs)介导了脂肪组织和大脑之间的联系。它们通过膜蛋白转移到大脑中，并富集于神经元(特别是在海马体)中。进一步研究表明，高脂肪饮食喂养的小鼠或糖尿病患者的脂肪组织来源的EVs会诱发显著的突触损伤和认知障碍。这些EVs中miRNAs可以显著地降低它们对认知功能的负面影响。这些结果表明，对脂肪组织来源的EVs或其包裹物miRNAs的干预可能是糖尿病患者认知障碍的一种潜在药物干预策略。

来源: Extracellular vesicles mediate the communication of adipose tissue with brain and promote cognitive impairment associated with insulin resistance(*Cell Metabolism*)

32、科学家揭示完全由胚胎干细胞来源构成的小鼠胚胎发育模型

英国剑桥大学研究团队研究构建了一种完全由胚胎干细胞(ESCs)来源的小鼠胚胎模型，可以模拟小鼠胚胎的发育过程。研究人员开发了一个基于小鼠ESCs的体外模型。通过转录因子介导，该ESCs系诱导为胚胎外胚层干细胞。该模型再现了从胚胎第5.5天到第8.5天的发育过程，包括胃肠组织的发育、前后轴、大脑和心脏结构的形成、以及胚胎外组织的发育，如卵黄囊和绒毛膜。将单个结构的细胞进行RNA测序，并与时间匹配的胚胎结果进行比较，发现各细胞系的外模型与自然发育在时间和位置上的差异。该研究结果表明，ESCs具有多能的可塑性，具有自我分化并发育为类似全胚胎结构的潜力。

来源: Mouse embryo model derived exclusively from embryonic stem cells undergoes neurulation and heart development(*Cell Stem Cell*)

33、我国科学家揭示抗精神病药物引发代谢综合征相关分子机制及其预防新靶点

上海交通大学医学院附属瑞金医院研究团队揭示了抗精神病药物引发代谢综合征的分子机制。研究团队发现，抗精神病药物通过影响脂肪组织中的miRNAs表达，介导了脂肪组织与大脑之间的联系。他们通过膜蛋白将miRNAs转移到神经元中，并富集于海马体。进一步研究表明，高脂肪饮食喂养的小鼠或糖尿病患者的脂肪组织来源的EVs会诱发显著的突触损伤和认知障碍。这些EVs中miRNAs可以显著地降低它们对认知功能的负面影响。这些结果表明，对脂肪组织来源的EVs或其包裹物miRNAs的干预可能是糖尿病患者认知障碍的一种潜在药物干预策略。

来源: Multi-omics analysis identifies rare variation in leptin/PPAR gene sets and hypermethylation of ABCG1 contribute to antipsychotics-induced metabolic syndromes(*Molecular Psychiatry*)

34、我国科学家构建头颈部鳞状细胞癌药物基因组图谱

上海交通大学医学院附属第九人民医院的科研团队构建了全球首个HNSCC药物基因组图谱，推动了HNSCC的精准治疗新进程。科研团队提出了HNSCC的药物基因组学研究，构建了头颈部鳞状细胞癌细胞模型库(HNCR)，其中包含56株患者来源的细胞和另外18株永生化细胞系。通过高通量药物筛选，该研究进一步整合了基因组数据、转录组数据、药效数据和临床信息，构建了首个涵盖多维度异质性的肿瘤全息大数据及药物基因组图谱，并最终明确了涵盖129个可适应症快速进入临床应用的“老药新用”药物以及其对应药效标志物。该研究旨在促进HNSCC的精准治疗，为今后HNSCC“老药新用”和临床标准治疗优化提供了重要依据，也为口腔颌面-头颈肿瘤精准诊治及精准防控提供支撑。

来源: Pharmacogenomic landscape of head and neck squamous cell carcinoma informs precision oncology therapy(*Science Translational Medicine*)

35、我国科学家实现炎症相关mRNA体内实时动态成像及早期诊断

中国科学院上海生命科学研究院的研究团队实现了炎症相关mRNA在体内的实时动态成像。他们开发了一种基于荧光共振能量转移(FRET)的成像系统，可以在活体小鼠中实时监测炎症相关mRNA的表达。该系统由一种特异性识别炎症相关mRNA的探针和一种能够穿透细胞膜的荧光染料组成。当探针与mRNA结合时，染料发出荧光，从而实现mRNA的实时成像。该研究为炎症相关疾病的早期诊断和治疗提供了新的思路。

来源: Spatially resolved in vivo imaging of inflammation-associated mRNA via enzymatic fluorescence amplification in a molecular beacon(*Nature Biomedical Engineering*)

36、我国科学家揭示脑膜淋巴管在调控应激易感性性别差异的机制

中山大学中山医学院和中南大学湘雅二医院的联合研究团队发现脑膜淋巴管在调控应激易感性的性别差异机制中的重要作用。该研究发现了亚慢性可变应激(Sub-Chronic Variable Stress, SCVS)诱导雌鼠产生抑郁样和焦虑样行为，并伴随着雌鼠脑膜淋巴管结构和功能发生损伤，进而调控脑膜淋巴管可改变雌雄小鼠对应激诱导的抑郁样和焦虑样症状的易感性。该研究发现，应激诱导脑膜淋巴管内皮细胞表达趋化因子CCL6损伤其自身，进而导致甘油三酯等脂质分子在情绪关键脑区前额叶皮层和腹侧被盖区累积，引发星形胶质细胞数量和中脑腹侧被盖核(Ventral tegmental area, VTA)多巴胺神经元活性异常。该研究首次发现反复应激引起脑膜淋巴管损伤可能是影响不同性别个体对应激易感性的关键因素。

来源: A functional role of meningeal lymphatics in sex difference of stress susceptibility in mice(*Nature Communications*)

37、科学家发现人心脏重编程过程中的关键因子

美国阿拉巴马大学伯明翰分校研究人员发现并鉴定了转录因子TBX20能提高人心脏成纤维细胞诱导率，还证明了在TBX20参与的情况下，人为诱导的心肌细胞更为成熟且具有收缩性，揭示了TBX20与传统重编程因子协同作用并且激活心脏细胞重编程的重要机制。该研究不仅证明在人类诱导的心肌细胞中TBX20可作为促进心脏收缩、成熟和能量代谢功能的关键因子，揭示了其通过与传统重编程因子协同激活心脏相关增强子元件的重要机制来重建心肌细胞特性和收缩性。在未来，TBX20可能作为有效的调控因子提升心肌细胞直接重编程用于转化治疗的可能性。

来源: TBX20 Improves Contractility and Mitochondrial Function During Direct Human Cardiac Reprogramming(*Circulation*)

学科发展论坛：神经外科

湖北省神经血管介入诊疗技术质控中心成立大会

中心成立大会合影

5、脑血管病之武汉大学中南医院烟雾病中心：

武汉大学中南医院烟雾病中心正式成立于2018年5月，目前是湖北省烟雾病国际科技合作基地、中国成人烟雾病临床研究（CAMD）华中地区牵头单位，每年能为200余例烟雾病患者提供手术治疗，是目前湖北省最大的烟雾病诊疗中心之一。中心拥有湖北省第一台ZEISS KINEVO-900手术显微镜以及烟雾病基础研究实验室，近年来在临床和基础研究方面均取得优异成绩。临床方面陈劲草教授是湖北省最早开展烟雾病手术治疗的专家，并参与编写了烟雾病和烟雾综合征诊断与治疗中国专家共识(2017)及烟雾病治疗中国专家共识，所主持的联合血管重建术治疗烟雾病的研究获湖北省科技进步二等奖；2022年中心主任章剑剑教授在国内外首次提出新型侧侧吻合式“血流自主调节性搭桥”治疗烟雾病的理论，大大降低了颅内血管搭桥术围手术期过度灌注并发症及出血率，降低死亡率的同时也改善了患者预后，该新术式治疗烟雾病的研究已发表在临床神经外科领域顶级杂志“Journal of Neurosurgery”上，同时团队也受邀在日本神经外科学会举办的世界烟雾病大会上分享新术式治疗烟雾病患者的经验，获得国际上的认可；此外团队也作为唯一中国编者单位参与了美国教材级神经外科书籍“Handbook of Neurosurgery”第九版搭桥章节。

湖北省脑血管外科（烟雾病）国际科技合作基地学术委员会成立会

湖北省脑血管外科（烟雾病）国际科技合作基地成立

参与制定“中国烟雾病诊疗专家组共识”

中心陈劲草教授和章剑剑教授在全美顶级大师班授课

中心章剑剑教授在日本和美国烟雾病中心进行学术交流

中心章剑剑教授在国际烟雾病大会上发言

6、神经肿瘤之神经胶质瘤诊疗中心：

武汉大学中南医院“神经胶质瘤临床诊疗中心”于2019年7月成立，由神经外科牵头，在李志强教授的带领下，联合头颈肿瘤放疗科、神经内科、神经病理、神经影像、神经康复及护理等专业，基于神经胶质瘤MDT多学科团队模式，严格遵照国家卫生健康委员会医政医管局《脑胶质瘤诊疗规范》运行。自成立以来，通过系统的术前评估；应用德国Carl-Zeiss OPMI K900荧光显微镜、Remebot手术机器人等先进设备和术中神经电生理监护系统、神经导航系统、术中超声等多模态脑功能定位技术先后为近千名患者提供了神经胶质瘤“精准手术”；术后序贯性的个性化化疗及规范化的病情随访，真正做到了“神经胶质瘤的精准治疗”，相关经验技术也在国内交流和省内示范，并在全省范围内积极推广，逐步成为省内乃至中南地区的标杆。2022年3月正式成为国家神经疾病医学中心脑胶质瘤MDT专科联盟理事单位。

2022年3月，成为国家神经疾病医学中心脑胶质瘤MDT专科联盟理事单位

李志强教授在手术中

2019年9月，李志强教授主持成立了第一届湖北省临床肿瘤学会(ESCO)脑胶质瘤专委会

学科发展论坛：神经外科

2019年11月，李志强教授主导“神经胶质瘤MDT诊疗模式医联体推广行动（孝感站）”，倡导省内胶质瘤治疗规范化、均质化

2019年12月，李志强教授、马超主任赴日本金泽大学神经外科访问，与中田教授交流手术经验及科研合作进行了深入交流

2021年，MDT团队在第10届华山脑胶质瘤诊疗学习班上进行交流

6、神经肿瘤之听神经瘤“微笑计划”：

武汉大学中南医院神经外科听神经瘤“微笑计划”成立于2020年5月26日，在陈劲草教授的带领下，截止目前收治病人96例，肿瘤手术全切率、面神经术中解剖保留率双100%，严重并发症及死亡率0。该计划特色包括坐位手术体位，术野清晰暴露；CT定位指引导内听道磨除，保证肿瘤能够全切；自主创新设计听神经瘤八件套手术器械；术中电生理持续监测面听神经三叉神经功能；听神经瘤相关专利成果转化（可调节吸引器头、持续引流脑棉，冲吸一体吸引管）；建立病人资料库及随访。目前各项技术均处于全国领先地位。听神经瘤“微笑计划”希望所有听神经瘤患者都能够笑着听世界。

2020年5月中南医院听神经瘤微笑计划启动会

多学科团队交叉开展听神经瘤手术，开创中南新模式

自主研发可调压吸引器（现已量产，并在30余家医院推广使用）

自主研发听神经瘤纤维器械-听神经瘤八件套（现已量产）

7、颅底脊柱亚专业：

颅底脊柱亚专业负责人刘奎教授，师从我国神经外科第一位院士、国家最高科学技术奖获得者王忠诚院士，最高颅底肿瘤的手术治疗处于国内一流水平。还是我国最早开展脊柱脊髓疾病的神经外科专家之一，在国内神经外科领域享有盛誉，对颅底脊髓疾病有着深厚的临床经验。在全国难症患者都慕名而来。2019年，颅底复杂疾病手术40余台/年，脊柱脊髓疾病50余台/年，而且每年都在稳步增长。团队成员均在国内外顶尖神经外科中心进修学习，已完成颅眶沟通巨大肿瘤切除、颅颈交界区复杂肿瘤切除、颅颈交界畸形整复、椎管内沟通病变切除与脊柱固定等既往多学科协助完成的手术，治疗效果显著，打造了良好的口碑和知名度。

刘奎教授在手术中

刘奎教授在武汉大学医联体单位分享临床经验

8、神经功能外科：

武汉大学中南医院神经功能外科，一直是武大中南医院神经外科最具特色的亚专业之一。早在2010年，在张捷主任的带领下就开展了脑深度电极植入术DBS治疗帕金森病，也是湖北省最早开展这类手术的单位，年手术量达80-100台。2020年，科室引进了曾获得王忠诚青年医师奖的熊南翔教授，作为湖北省电生理学会会长及神经疼痛、面肌痉挛等领域专家，在他的带领下我科在相关疾病领域成为省内开展相关手术最多、病例最复杂的单位，3每年手术量超过400例，且在全国有一定影响力。功能神经外科的病源以华中地区为主，向江西、西北、甘肃、云南等地辐射。除神经外科在癫痫及意识障碍领域也全面开展了功能。

功能神经外科的团队实力较强，亚专业人员结构合理。目前亚专业组有7-8名医师组成，其中2名主任医师，3名副主任医师，所有人均具有博士学位及海外留学经历。组内还有3-4名轮转的住院医师。专业组还配备3名全职电生理监测技术人员。

功能神经外科的手术多为高精尖手术，亚专业配备齐全的阿尔法-欧米伽微电极记录仪，LEKCELL立体定向头架，意识电位记录仪等设备，并在湖北省最先引入我国完全自主知识产权的神经外科手术机器人。作为国家限制性医疗技术之一（G10人工智能辅助治疗技术），亚专业已完成40余台，其中1/3为SEEG、DBS等功能神经外科领域的手术，且均在省卫检委平台上登记上报。

学科发展论坛：神经外科

10、神经内镜亚专业：

神经内镜技术开创了全新的神经外科微创领域，在科室主任陈劲草教授的大力支持下在我科曹长军主任的带领下于2015年在省内率先广泛开展神经内镜手术，每年完成神经内镜手术约200余台，其中开展神经内镜手术涉及经典鼻颅底内镜手术包括神经内镜下经鼻垂体瘤切除术、颅咽管瘤切除术、脊索瘤切除术、Rathke囊肿切除术、三叉神经鞘瘤切除术、视神经管减压术、脑脊液漏修补术、脑干海绵状血管瘤切除术、眼眶海绵状血管瘤切除术；经颅内镜手术包括神经内镜下脑出血清除术、微血管减压术、硬膜下血肿清除术、蛛网膜囊肿切除术、脑室肿瘤切除术、大脑肿瘤(海绵状血管瘤、鞍结节脑膜瘤)切除术；神经内镜辅助显微镜松果体肿瘤切除术、听神经瘤切除术、动脉瘤夹闭术等。因内镜手术微创、恢复快、效果好，取得了广大患者的信任和满意。2019年获批为中国医师协会神经内镜培训基地，并牵头成立了神经内镜及垂体瘤诊治中心。连续数年主办神经内镜相关的国家级继续教育培训，培训省内外学员数百人，举办神经内镜相关的学术会议十余次，包括中国内镜大会神经内镜分会、东湖国际论坛、武汉大学中南医院神经内镜继续教育培训班等；为促进该技术在基层医院推广与规范临床操作，曹长军主任、熊忠伟主任团队先后在我院医联体成员单位开办神经内镜培训班十场，结合理论与模型教学，并手术演示等形式进行全面、系统的培训，提高基层医院对神经内镜技术的认识，规范其操作，从而推动省内神经内镜技术的健康发展。

在全国内镜大会分享“中南经验”

陈劲草教授和曹长军主任在国家级继续教育神经内镜培训班进行授课中

熊忠伟主任在基层神经内镜培训班授课中

全国内镜培训基地及武汉大学中南医院垂体瘤诊疗中心授牌仪式

11、武汉大学中南医院脑科学研究中心

武汉大学中南医院脑科学研究中心成立于2020年11月，在学科带头人陈劲草教授的带领下，在2年的时间内发展成为由院士领衔8名国家级人才组成的基础科研团队。目前中心围绕临床诊疗、基础研究和药物研发搭建交叉研究团队。联合武汉大学医学研究院、药学院和化学学院等开展多项交叉学科研究，目前成员70余人，90%以上具有博士学位，平均年龄为35岁，其中包括国家杰青2名，国家海外高层次人才计划特聘专家6名以及湖北省百人计划专家4名。实验室拥有独立科研场所200平方，4个独立操作间，拥有科研仪器及重要设备总价值达300余万元，目前实验室能够独立开展分子生物学、高通量测序、细胞生物学、病理学及动物行为学等实验。近年来，第一作者或通讯作者发表SCI论文200余篇，其中包括发表在Nature Neuroscience、Cell Research、Nature Communication、PNAS、Cancer Research、Cell Reports等众多高水平SCI期刊。截止目前中心共承担国家级科研项目和省部级科研项目共30余项，获得省部级科技进步奖2项。

武汉大学中南医院脑科学研究中心授牌仪式

实验室仪器平台

中心发表多篇高水平研究性论文

中心李翔教授团队联合美国澳洲团队以武大中南医院神经外科为第一单位在Cell子刊发表最新研究成果揭示新型神经表观遗传学机制调控记忆存储

周良辅院士工作站揭牌仪式

学科发展论坛：神经外科

12、教学

在本科生和研究生教学方面，科室目前拥有博士生导师4名、硕士生导师12名。为积极响应国家及武汉大学提高教学质量的号召，加强研究生科研和临床能力，神经外科全力配合学院教学工作，并配备了专职教学秘书。目前科室有硕士和博士研究生40余名，在学院要求时间内，保质保量完成各阶段研究生开题答辩、中期考核、年度考核、毕业预答辩、毕业答辩等工作。

每周一次教学小讲课活动；
每两周一次神经外科英语专项教学

每两周一次神经外科相关解剖专项教学

立项并建设全国神经外科MOOC课程

监督各课题组每月开展一次组会，研究生汇报工作进展

学科巡礼

1、武汉大学儿童健康大数据研究中心成立五周年暨《大数据下的儿童早期健康发展报告》发布活动举行

10月21日上午，武汉大学儿童健康大数据研究中心成立五周年暨《大数据下的儿童早期健康发展报告》发布活动在武汉大学医学部举行。武汉大学儿童健康大数据研究中心成立五年来，服务于我国生育刚需，不断深化儿童健康数据的转化应用，持续加强儿童健康数据的存储、分析挖掘、隐私保护研究等关键技术攻关，致力于培育儿童健康医疗大数据应用新业态，在儿童公共卫生、临床医疗及科研创新的大数据应用方面做了大量的工作，为儿童早期发展、疾病预防、早期诊断和个性化治疗做出了重要贡献。武汉大学儿童健康大数据研究中心主任、中南医院妇女儿童医院副院长赵东赤教授在会上进行了《大数据下的儿童早期健康发展报告》发布。他介绍，报告数据来源于全国11省66个城市的229家医疗机构，其中三甲医院39家，妇幼保健院74家，儿童医院9家，累计为133万儿童提供健康专业测评与指导。发展报告数据采集获得武汉大学中南医院伦理委员会批准。《报告》从儿童出生率变化、早产儿出生状况、孕产妇产后数据、儿童保健常见问题、养育照护指导等多个方面进行了分析与阐释，许多结论为首次发布，在与会专家中引起强烈反响。

2、研究表明：良好的通风是营造应急医院安全环境的关键

近日，国际著名期刊 Building and Environment 杂志 (1区, IF=7.093) 在线发表了武汉大学中南医院，清华大学建筑学院，感染性疾病精准防控与诊治湖北省工程研究中心多位学者联合研究论文《Investigation on the effectiveness of ventilation dilution on mitigating COVID-19 patients' secondary airway damage due to exposure to disinfectants》。本研究共同第一作者包括王莹（武汉大学中南医院医

(供稿：神经外科)

第二台手术是刘金平主任带领张力和潘高峰医生，在超声科、麻醉科和手术室配合下完成的一例大瓣环主动脉瓣关闭不全经心尖TAVR手术。武汉大学中南医院王斌主任术前术中为患者进行了精准的心脏超声提示，为术者选择瓣膜，精准定位主动脉瓣环位置提供了帮助。

最后一台压轴手术是由武汉大学中南医院刘金平主任主刀，朱少平、董哲医生配合的微创二尖瓣成形+房颤射频消融+左心耳缝闭术。

5、我院获批2022年中国药学会医院药学会专委会唯一重点科研项目

2022年中国药学会医院药学会专业委员会医院药学会
科研专项资助项目

项目类型	序号	项目名称	单位	项目负责人
重点项目 (1项)	1	乳腺癌精准免疫治疗关键技术研究	武汉大学中南医院	胡汉昆
	2	基于丝氨酸蛋白酶 HTRA1 促进胰腺炎-癌恶性转化机制的分子靶向药物研发	大连医科大学第一附属医院	董得时
面上项目 (4项)	3	移植患者全程化管理和精准用药体系构建及系统开发应用	华中科技大学同济医学院附属协和医院	韩勇
	4	基于真实世界数据和PK/PD模型引导的吡仑帕奈在癫痫患者中的群体药代动力学、有效性和安全性研究	复旦大学附属华山医院	马春来
	5	基于微生物-代谢物-炎症网络挖掘产后抑郁的组合物标志物及金纳素的干预作用	华中科技大学同济医学院附属协和医院	程学佳

中国药学会医院药学会专业委员会从2021年起开始设立医院药学会科研专项资助项目，旨在提高医院药师的临床实践和科研水平。近日，中国药学会官网公示并印发文件，公布了2022年中国药学会医院药学会专业委员会药学会科研专项资助项目。基于药学会与甲乳外科长期深度交叉融合的临床科研工作基础，本次由胡汉昆主任药师、吴高松教授组建的联合申请团队，精心准备，积极参与这项唯一重点项目的申报，与多家“复旦中国医院排行榜百强医院”提交的93个申请项目进行竞争。经过两轮激烈竞争性评审与答辩，团队终于摘取了这枚专委会专项份量最重的“科研金牌”，并获得40万元科研经费。

6、探索生命密码：张楹课题组揭示基因组编辑工具新机制

图 | 相关论文 (来源: Molecular Cell)

10月21日，国际学术期刊Molecular Cell (《分子细胞》) 在线发表武汉大学医学研究院、免疫与代谢前沿科学中心、武汉大学中南医院张楹课题组关于DNA拓扑结构调控基因编辑器AtCas9与靶DNA互作的研究成果。审稿专家对论文评价道：“这项研究照亮了Cas9和PAM互作的新方向，为今后研发精简不依赖PAM序列的基因编辑工具提供了新的路径，具有重大意义。”

<专利动态>

10.21-11.20	发明专利	新型实用专利 (外观)	软件著作权
申请数量	7	0	0
获批数量	4	17	0

<专利大讲堂-临床医生应当知道的专利常识>

一、对医生而言，可以申请哪些类型专利？

医学上常见的申请类型有：

- (1) 器械，装置，医用材料，试剂
- (2) 生物组织工程技术，如生物材料、组织构建方法
- (3) 西药/中药/化合物的药品本身、制备方法、医药用途
- (4) 诊断试剂，诊断试剂盒
- (5) 经过分离并具有特定工业用途的微生物
- (6) 物质的检测/实验方法（如：结核分枝杆菌荧光定量PCR检测方法）
- (7) 生物技术领域，如基因、重组载体、转化体等（如：用于治疗慢性疼痛的多肽）
- (8) 动物模型建立方法（如：小鼠烫伤模型的建立方法）
- (9) 医用的系统（如：脑瘫患者坐姿脊柱矫正测量系统）
- (10) 监测方法，处理方法，控制方法，评价方法

二、医生一定要注意申请专利和发表论文的顺序

发表论文的过程中，从投稿，到录用，再到见刊，文章一旦见刊，也就意味着社会公众都可以查阅到论文中的具体内容了。而申请专利的过程中，从申请，到授权，再到拿到证书，专利一旦公开或公告，也就意味着社会公众都可以查阅到专利的具体内容了。

但是，根据中华人民共和国专利法规定，专利的授权需要满足新颖性，也就是说，在专利申请之前没有人公开过且没有人提出过专利申请才可以。论文发表就是公开了，不管论文的作者是谁，此后任何人都因为新颖性的丧失而再也申请不到专利了。因此一定要先申请专利再发表论文，两个都不耽误；如果搞反了，专利就没有新颖性了，从而也就失去了获得授予专利权的机会。

注意：一定要确保专利的申请日期在论文的见刊日期之前！

一般在论文初稿的时候，就要同步申请专利，申请专利与论文相比，不需要象论文一样，一个字一个字的修改。另外，论文一般从投稿到发表，大约1年左右时间。而专利申请一般为1-2年左右时间。因此，在初稿阶段就准备申请专利，两个时间点吻合的，一般可以保证在专利申请下来时，论文也能同步发表。

不过，专利与论文不同的是，专利可以更早，因为专利有时不一定是已经实现了的产品或成果，还可以在初步规划中的，因此，可以带有一定的推理性的。可以事先申请进行一定的保护。后续研究成果成型或写文章时，可以再次申请新的专利，并不冲突。

三、医生配合对提高申请专利的成功率十分重要

专利申请与批准又不一样。目前申请的发明专利，只有不到一半的专利最终能被成功批准。因此，在专利申请时对专利的把关，角度，设计，以及寻找创新性，十分重要，以提高申请成功率。

同时，专利的技术资料的准备力求详尽清楚，专利代理人根据一份详尽清楚的技术资料来进行专利申请文件的撰写可以更好地确保专利申请文件的质量，从而可以有效提高专利申请的成功率。毕竟，针对于特定的技术领域，发明人才是技术专家，专利代理人仅仅是对专利申请和审查的规定更为熟悉而已。如果没有专业团队支持，很难对医学的产品有更深入地认知。

四、专利的成果转化中注意的问题

专利申请不仅仅是评职称，最得要的是能转化，能转化出来，这是对社会的最大贡献，也是个人收益最高的环节。一些有价值的专利，转让出来的价格从几十万到几千万不等。但是，在成果转化中，也要注意一些关键点，以促进成果转化成功：

1、临床医生应该积极推动产品化

很多医疗机构的科技部门都致力于本机构科研成果的转化，医生可以向他们求助以实现专利到产品的转化。考虑到，本机构的科技处的人力有限，也可以求助于第三方服务机构来联系厂家促成技术合作，实现科技成果的转化。

2、医疗机构应优先采购本机构科技成果转化的创新产品

实践中，很多厂家与医生的技术合作，都因为产品潜在市场需求不明确而受阻。如果医疗机构能给予鼓励和支持将可以大大促进本机构的工作人员的科技成果的转化。当然，这不容易做到，不过，成果转化出来的产品，发明的医生可以作为产品的背书。

许多医生发明人发明产品以后，转让给企业，后续该产品的临床研究，临床应用，该专家都全力支持，促进产品更好地商业化。

3、医生作为发明人不要有过高地利益期望

要知道，一个创新成果到专利，再到样品或样机，再到产品量产，有很多不确定的因素，也存在具体的投入风险。因此，医生作为专利权人对此一定要有清楚的认识，不要对自己的专利有过高地利益期望，而应该更加关注科技成果转化的成功。以终为始，我们发明创新的初衷不就是想更好地为患者服务，更好地造福人民群众吗。

成果转化的方式有很多种，包括一次性转让，另外还有以知识产权入股（一般专利可以作为25-30%的比例），当然，还可以分几步进行，第一部分是价格要求低，但是可以后续要求对以后的销售收入进行分成，等等。

总之，只要是合理的期望，能让产品更好地服务社会，总是有希望进行转化的。

《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》

2022年11月17日，外交部发布《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》，结合中国在科技伦理领域的政策实践，从人工智能技术监管、研发、使用及国际合作四个方面提出主张。

以下是政策原文。

一、人工智能作为最具代表性的颠覆性技术，在给人类社会带来潜在巨大发展红利的同时，其不确定性可能带来许多全球性挑战，甚至引发根本性的伦理关切。在伦理层面，国际社会普遍担心如不加以规范，人工智能技术的误用滥用恐将损害人的尊严和平等、侵犯人权和基本自由、加剧歧视和偏见、冲击现有法律体系等，并对各国政府管理、国防建设、社会稳定甚至全球治理产生深远影响。

中国始终致力于在人工智能领域构建人类命运共同体，积极倡导“以人为本”和“智能向善”理念，主张增进各国对人工智能伦理问题的理解，确保人工智能安全、可靠、可控，更好赋能全球可持续发展，增进全人类共同福祉。为实现这一目标，中国呼吁各方秉持共商共建共享理念，推动国际人工智能伦理治理。

二、2021年12月，中国发布《关于规范人工智能军事应用的立场文件》，呼吁各方遵守国家或地区人工智能伦理道德准则。中国现结合自身在科技伦理领域的政策实践，参考国际社会相关有益成果，从人工智能技术监管、研发、使用及国际合作等方面提出以下主张：

（一）监管

各国政府应坚持伦理先行，建立并完善人工智能伦理准则、规范及问责机制，明确人工智能相关主体的职责和权力边界，充分尊重并保障各群体合法权益，及时回应国内和国际相关伦理关切。

各国政府应重视人工智能伦理与法律的基础理论问题研究，逐步建立并完善人工智能伦理规范、法律法规和政策体系，形成人工智能伦理指南，建立科技伦理审查和监管制度，加强人工智能安全评估和管控能力。

各国政府应增强底线思维和风险意识，加强研判人工智能技术的潜在伦理风险，逐步建立有效的风险预警机制，采取敏捷治理，分类分级管理，不断提升风险管控和处置能力。

各国政府应立足自身人工智能发展阶段及社会文化特点，遵循科技创新规律，逐步建立符合自身国情的人工智能伦理体系，健全多方参与、协同共治的人工智能伦理治理体制机制。

（二）研发

各国政府应要求研发主体加强对人工智能研发活动的自我约束，主动将伦理道德融入人工智能研发过程各环节，避免使用可能产生严重消极后果的不成熟技术，确保人工智能始终处于人类控制之下。

各国政府应要求研发主体努力确保人工智能研发过程的算法安全可控，在算法设计、实现、应用等环节，不断提升透明性、可解释性、可靠性，逐步实现可审核、可监督、可追溯、可预测、可信赖。

各国政府应要求研发主体努力提升人工智能研发过程的数据质量，在数据收集、存储、使用等环节，严格遵守所在国的数据安全规定、伦理道德及相关法律标准，提升数据的完整性、及时性、一致性、规范性和准确性等。